

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.
C. C. P. : DIJON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

15 NF

Supplément n° 3 au Bulletin n° 44 - MAI 1964 -

25 MAI 1964

VIGNE

MILDIU : Quelques très rares taches sont apparues à la suite des contaminations provoquées par les pluies du 8 Mai. Nous conseillons l'application d'un traitement dans la période du 28 au 30 Mai. Poursuivre l'ébourgeonnage. Les vignes à très forte végétation gagneront à être relevées avant le traitement.

OIDIUM : L'addition d'un soufre mouillable à la bouillie précédente est recommandée.

VERS DE LA GRAPPE : Le vol des papillons, très irrégulier, se poursuit. Dans les vignes sensibles aux dégâts des vers (chenilles), utiliser l'un des produits recommandés dans la liste communiquée à tous les abonnés.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES : Le vol des papillons s'intensifie. Un premier traitement devra être exécuté avant le 30 Mai avec l'un des produits cités sur l'édition spéciale.

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER : Ajouter à la bouillie insecticide un anti-tavelure.

PETITS FRUITS

ANTHRACNOSE DU GROSEILLIER : Dans les plantations non suffisamment protégées, on assiste actuellement à une attaque sévère de ce champignon, la défeuillaison se produisant déjà. Partout où la maladie est visible, il est recommandé d'effectuer un nouveau traitement, de préférence avec un oxychlorure 50 % à la dose de 0 Kg 500 par hectolitre.

SEISIE DU GROSEILLIER NOIR (CASSIS) : Abondante sortie de papillons. Traitement indiqué avant la fin du mois avec un produit à base de Méthylparathion, D.D.T. ou Lindane. Les poudrages semblent plus efficaces, pénétrant mieux à l'intérieur de la touffe. Au cas où le vol se prolongerait, répéter le traitement dans les 10 jours qui suivront.

POMMES DE TERRE

DORYPHORE : Les pontes sont nombreuses dans certains secteurs, les premières éclosions vont avoir lieu. Surveiller attentivement les cultures et intervenir si la présence de larves est constatée, avec l'un des produits conseillés sur la liste spéciale.

COLZA

PUCERONS CENDRES : Des foyers existent dans certains champs, il est recommandé de repérer ceux-ci et si nécessaire, de faire un traitement localisé, à base de Lindane ou d'esters phosphoriques, pour éviter leur extension qui peut être dangereuse, surtout par temps sec et chaud. Attendre la fin de la floraison pour éviter les destructions d'abeilles.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :
H. SCULIE.

L'imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté. Le Directeur-Gérant : L. BOUYZ.

P57